




- Porte** Arbustivo
- Altura máxima** 400 cm
- Característica copa** -
- Biotipo** Caducifolio
- Raíz** Medio
- Tipo de sombra** Ligera
- Gama de color de la flor** Amarillo/morado

Arbusto que puede alcanzar hasta 4 metros de altura, formando una **copa ancha y abierta**. Recibe su nombre común a causa del **color rojizo de su tronco y ramas**, especialmente las más jóvenes, cubiertas también de pequeños pelos. Las **hojas** son compuestas con una **coloración verde-glaucá**. Los pies **masculinos producen pequeñas flores amarillentas**, mientras que los **femeninos producen flores rojo-púrpúreas**.



Sustrato orgánico
Buen drenaje
Mantillo de hojas

CROMATISMO FENOLÓGICO



SERVICIOS ECOSISTÉMICOS



ANOTACIONES ESTRATÉGICAS

- Nivel de protección** Orden de Flora (Anexo II)
- Tipología de ajardinamiento idóneo** EL. 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12. IT. 2, 4
- Tipo de núcleo idóneo** Núcleos de costa y medianías
- Tipo de hábitat de interés comunitario** 9320
- Piso de vegetación habitual** Azonal asociada a cauces de barrancos
- Coste de mantenimiento** Bajo
- Nociones de precaución** -
- Interacciones con la fauna**


CONDICIONES DE CULTIVO

- AÉREO**
 - Resistencia al viento
 - Resistencia al calor
 - Resistencia a la poda
 - Floración
- SUELO**
 - Sustrato
 - Drenaje
 - Consumo de agua
 - Resistencia salinidad

SABER MÁS

Se ha empleado en la medicina popular para el tratamiento de diversas dolencias como astringente para cortar diarreas, utilizándose la raíz hervida. Al parecer también tiene algunos efectos cicatrizantes. Además, su uso en ajardinamiento en el archipiélago es frecuente.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



*Para consultar la autoría de cada fotografía, puedes acceder al apartado "Créditos de Autoría Externa" en el margen inferior de la web. El uso de estas imágenes está sujeto a los derechos de sus respectivos autores, por lo que cualquier utilización indebida será responsabilidad exclusiva del usuario.