

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS

	Porte	Arbustivo
	Altura máxima	30 cm
	Característica copa	-
	Biotipo	Perenne
	Raíz	Pequeñas
	Tipo de sombra	Sin sombra
	Gama de color de la flor	Rosa

TOMILLO DE MAR


Frankenia ericifolia



Se trata de una pequeña planta perenne, que se diferencia de otras especies del género por sus hojas cortamente pecioladas. **Muy parecida a *Frankenia capitata***, presente en hábitats similares, se diferencia por ser **menos compacta** y tener **flores blanquecinas** dispuestas a lo largo de los tallos.

CROMATISMO FENOLÓGICO

* No se localizan fotos del fruto



Sustrato inorgánico
Buen drenaje
Textura arenosa

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS



ANOTACIONES ESTRATÉGICAS

Nivel de protección	-
Tipología de ajardinamiento idóneo	EL. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10. IT. 1, 2, 3. ED. 1, 2
Tipo de núcleo idóneo	Núcleos de costa
Tipo de hábitat de interés comunitario	1250
Piso de vegetación habitual	Cinturón halófilo-costero
Coste de mantenimiento	Bajo
Nociones de precaución	-
Interacciones con la fauna	


CONDICIONES DE CULTIVO

AÉREO		Resistencia al viento		Resistencia al calor		Resistencia a la poda		Floración Enero-noviembre
		Sustrato		Drenaje		Consumo de agua		Resistencia salinidad

SABER MÁS

Es una especie nativa que en Canarias cuenta con dos subespecies: subsp. *ericifolia*, en todas las Islas, y subsp. *latifolia*, endémica de Tenerife y La Palma.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



*Para consultar la autoría de cada fotografía, puedes acceder al apartado "Créditos de Autoría Externa" en el margen inferior de la web. El uso de estas imágenes está sujeto a los derechos de sus respectivos autores, por lo que cualquier utilización indebida será responsabilidad exclusiva del usuario.