





	Porte	Rastrera
	Altura máxima	50 cm
	Característica copa	-
	Biotipo	Anual
	Raíz	Pequeñas
	Tipo de sombra	Sin sombra
	Gama de color de la flor	Amarillo

Se trata de una especie **presente en lugares áridos y arenosos** de todo el archipiélago, que puede ascender por encima de los 500 metros en algunas zonas orientadas al sur. Es una **planta tapizante** que puede alcanzar **grandes extensiones de terreno** si se le permite.

CROMATISMO FENOLÓGICO



Sustrato inorgánico
Buen drenaje
Textura arenosa



SERVICIOS ECOSISTÉMICOS



ANOTACIONES ESTRATÉGICAS

Nivel de protección	-
Tipología de ajardinamiento idóneo	EL. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. IT. 1, 2, 3, 4. ED. 1
Tipo de núcleo idóneo	Núcleos de costa
Tipo de hábitat de interés comunitario	-
Piso de vegetación habitual	Cinturón halófilo-costero, tabaibal-cardonal
Coste de mantenimiento	Bajo
Nociones de precaución	-
Interacciones con la fauna	


CONDICIONES DE CULTIVO

AÉREO		Resistencia al viento		Resistencia al calor		Resistencia a la poda		Floración Enero-mayo
		Sustrato		Drenaje		Consumo de agua		Resistencia salinidad

SABER MÁS

Durante los periodos de hambruna sirvió para hacer «gofio de vidrio», una especie de harina que servía de alimento a la gente más pobre. Es una de las especies barrilleras que se quemaban especialmente en Lanzarote y Fuerteventura para obtener sosa cáustica.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



*Para consultar la autoría de cada fotografía, puedes acceder al apartado "Créditos de Autoría Externa" en el margen inferior de la web. El uso de estas imágenes está sujeto a los derechos de sus respectivos autores, por lo que cualquier utilización indebida será responsabilidad exclusiva del usuario.