

## CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS

	<b>Porte</b>	Arbustivo
	<b>Altura máxima</b>	600 cm
	<b>Característica copa</b>	600 cm - Oval
	<b>Ciclo de vida</b>	Perenne
	<b>Raíz</b>	Grande
	<b>Tipo de sombra</b>	Ligera
	<b>Gama de color de la flor</b>	Rosa

## CROMATISMO FENOLÓGICO



## TEJO

*Erica platycodon subsp. platycodon*



Esta especie suele presentar un porte arbustivo, pudiendo alcanzar una altura de hasta seis metros. Suele encontrarse **asociada al brezo**, aunque es mucho menos abundante. Su aspecto es **achaparrado** y con un **follaje de tonalidad verde oscuro, brillante y rígido**. La **corteza se desprende fácilmente** en tiras largas, dejando el **tronco rojizo** a la vista. Sus **flores** son pequeñas, de **color rosado** y con forma de pequeñas campanitas. Sus **frutos** son pequeñas cápsulas **rojas**.



Sustrato orgánico  
Buen drenaje  
Textura arenosa



## SERVICIOS ECOSISTÉMICOS



## ANOTACIONES ESTRATÉGICAS

<b>Nivel de protección</b>	Anexo III
<b>Tipología de ajardinamiento idóneo</b>	EL.1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12. IT. 2, 3, 4
<b>Tipo de núcleo idóneo</b>	Núcleos de medianías
<b>Tipo de hábitat de interés comunitario</b>	4050
<b>Piso de vegetación habitual</b>	Monteverde
<b>Coste de mantenimiento</b>	Bajo
<b>Nociones de precaución</b>	-
<b>Interacciones con la fauna</b>	

## CONDICIONES DE CULTIVO

<b>AÉREO</b>	Resistencia al viento	Resistencia al calor	Resistencia a la poda	Floración Abril-julio
<b>SUELO</b>	Sustrato	Drenaje	Consumo de agua	Resistencia salinidad

## SABER MÁS

Aunque popularmente se conoce como «tejo», no presenta parentesco con el tejo del continente europeo (*Taxus baccata*).

Su madera era muy valorada por su gran resistencia, y se empleó tanto en la elaboración de utensilios como para combustible. Sus ramas servían como forraje y cama para ganado.

## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

