


## CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS

	<b>Porte</b>	Arbustivo
	<b>Altura máxima</b>	200 cm
	<b>Característica copa</b>	-
	<b>Biotipo</b>	Perenne
	<b>Raíz</b>	Pequeñas
	<b>Tipo de sombra</b>	Sin sombra
	<b>Gama de color de la flor</b>	Morado

## CROMATISMO FENOLÓGICO



## ROMERO MARINO


*Campylanthus salsoloides*



Arbusto leñoso endémico del archipiélago canario, propio de zonas de tabaibal-cardonal. Esta especie se caracteriza por presentar un **porte bajo** y estar muy ramificado. Sus **hojas lineares y de color verde** contrastan, durante su floración, con sus **flores de colores rosados**.



Sustrato inorgánico  
Buen drenaje  
Textura arenosa



## SERVICIOS ECOSISTÉMICOS



## ANOTACIONES ESTRATÉGICAS

<b>Nivel de protección</b>	Orden de Flora (Anexo II)
<b>Tipología de ajardinamiento idóneo</b>	EL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. IT. 2, 3, 4. ED. 1. 2
<b>Tipo de núcleo idóneo</b>	Núcleos de costa y medianías
<b>Tipo de hábitat de interés comunitario</b>	5330
<b>Piso de vegetación habitual</b>	Tabaibal-cardonal
<b>Coste de mantenimiento</b>	Bajo
<b>Nociones de precaución</b>	-
<b>Interacciones con la fauna</b>	

## CONDICIONES DE CULTIVO

<b>AÉREO</b>		<b>Resistencia al viento</b>		<b>Resistencia al calor</b>		<b>Resistencia a la poda</b>		<b>Floración</b> Enero-julio
		<b>Sustrato</b>		<b>Drenaje</b>		<b>Consumo de agua</b>		<b>Resistencia salinidad</b>

## SABER MÁS

En algunos lugares de las islas se utilizaban sus ramas secas para realizar, de manera artesanal, las cachimbas de fumar.

## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

