

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS

	Porte	Arbustivo
	Altura máxima	300 cm
	Característica copa	-
	Biotipo	Perenne
	Raíz	Pequeñas
	Tipo de sombra	Escasa
	Gama de color de la flor	Amarillo


TABAIBA AMARGA

Euphorbia lamarckii



Arbusto endémico del archipiélago canario. Esta especie presenta **hojas largas y estrechas de color verde** que se disponen en **rosetas en el extremo de sus ramas**. En lo referido a sus **inflorescencias, son umbeliformes y presentan un color amarillo verdoso**.

CROMATISMO FENOLÓGICO



Sustrato inorgánico
Buen drenaje
Textura arenosa

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS



ANOTACIONES ESTRATÉGICAS

Nivel de protección	-
Tipología de ajardinamiento idóneo	EL. 1, 2, 4, 6, 9, 10. IT. 2, 4. ED. 1
Tipo de núcleo idóneo	Núcleos de costa y medianías
Tipo de hábitat de interés comunitario	5330, 9320, 9550, 9560
Piso de vegetación habitual	Tabaibal-cardonal
Coste de mantenimiento	Bajo
Nociones de precaución	Puede hibridar con otras del mismo género. Su látex es cáustico. No se aconseja su uso en Tenerife debido a la coexistencia de dos subsp. en la isla
Interacciones con la fauna	


CONDICIONES DE CULTIVO

AÉREO		Resistencia al viento		Resistencia al calor		Resistencia a la poda		Floración Diciembre-mayo
		Sustrato		Drenaje		Consumo de agua		Resistencia salinidad

SABER MÁS

Ha sido empleada en la medicina popular para el tratamiento de problemas de piel. Asimismo, esta especie también ha sido utilizada para «embarbasca».

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



*Para consultar la autoría de cada fotografía, puedes acceder al apartado "Créditos de Autoría Externa" en el margen inferior de la web. El uso de estas imágenes está sujeto a los derechos de sus respectivos autores, por lo que cualquier utilización indebida será responsabilidad exclusiva del usuario.