




	Porte	Arbustivo
	Altura máxima	150 cm
	Característica copa	-
	Biotipo	Vivaz
	Raíz	Pequeñas
	Tipo de sombra	Sin sombra
	Gama de color de la flor	Morado

Especie frecuente en todas las islas del archipiélago, a excepción de La Graciosa. Se encuentra en menor medida en las más orientales. Esta especie **desprende un agradable aroma**, además de dar lugar en su **floración** a unas **bonitas flores azul-violeta**. A finales del verano se caen casi todas sus hojas para brotar de nuevo con la llegada de la primavera, aunque esta circunstancia depende mucho del emplazamiento de cada ejemplar.

CROMATISMO FENOLÓGICO


* No se localizan fotos del fruto



Sustrato inorgánico
Buen drenaje
Textura arenosa



SERVICIOS ECOSISTÉMICOS



ANOTACIONES ESTRATÉGICAS

Nivel de protección	-
Tipología de ajardinamiento idóneo	EL. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12. IT. 2, 3, 4. ED. 1
Tipo de núcleo idóneo	Núcleos de costa y medianías
Tipo de hábitat de interés comunitario	5330
Piso de vegetación habitual	Tabaibal-cardonal
Coste de mantenimiento	Bajo
Nociones de precaución	Tiene varias subespecies. En Tenerife y La Palma, tiene dos subespecies naturales. Se recomienda recolectar semillas localmente para preservar su acervo genético
Interacciones con la fauna	


CONDICIONES DE CULTIVO

AÉREO		Resistencia al viento		Resistencia al calor		Resistencia a la poda		Floración Diciembre-junio
		Sustrato		Drenaje		Consumo de agua		Resistencia salinidad

SABER MÁS

Muy empleada en infusiones para aliviar distintas dolencias y para aromatizar espacios.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



*Para consultar la autoría de cada fotografía, puedes acceder al apartado "Créditos de Autoría Externa" en el margen inferior de la web. El uso de estas imágenes está sujeto a los derechos de sus respectivos autores, por lo que cualquier utilización indebida será responsabilidad exclusiva del usuario.